

“PROTOCOLO CLÍNICO PARA OS CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS” - (PARTE I)

Houve um aumento da probabilidade dos pacientes serem tratados por cirurgiões-dentistas, durante as várias fases da terapia antineoplásica, porque os pacientes diagnosticados com câncer, estão apresentando aumento na sobrevivência como resultado das melhorias no diagnóstico e dos avanços no tratamento.

Para manutenção da saúde bucal e melhoria da qualidade de vida do paciente oncológico, o cirurgião-dentista deve estar incluído como parte da equipe de saúde, para o tratamento contra o câncer.

As estratégias de tratamento baseiam-se na eliminação das células neoplásicas malignas, que se multiplicam, rapidamente, sem levar o hospedeiro à morte. Os protocolos terapêuticos incluem cirurgia, radioterapia, medicações citotóxicas, quimioterápicas e endócrinas, além do transplante de célula-tronco ou de medula óssea.

O plano de tratamento odontológico envolve:

- 1) Avaliação pré-tratamento oncológico e preparo do paciente.
 - 1.1) O cirurgião-dentista deve estar informado a respeito do tipo de tratamento escolhido e se o câncer apresenta boas chances de ser controlado.
 - 1.2) Eliminação da doença bucal que possa se agravar durante a terapia do câncer.
 - 1.3) Detectar lesões metastáticas.
 - 1.4) Minimizar o desconforto bucal durante a terapia do câncer.
 - 1.5) Tratamento odontológico:
 - 1.5.1) Instrução de higiene oral.
 - 1.5.2) Incentivo à dieta não cariogênica.
 - 1.5.3) Remoção de cálculo, profilaxia e fluoroterapia.
 - 1.5.4) Eliminação de todos os focos lesivos e infecciosos.
 - 1.5.5) Extração de dentes não restauráveis, com prognóstico ruim ou fora de possibilidades terapêuticas, com infecção aguda ou doença periodontal grave.
 - 1.5.6) Remoção de espículas ósseas pontiagudas, paredes ósseas fraturadas e amolecidas.
 - 1.5.7) Tratamento endodôntico de dentes não vitais sintomáticos, pelo menos, uma semana antes.
 - 1.5.8) Remoção de bandas ortodônticas.
 - 1.5.9) Remoção de próteses removíveis durante o tratamento.
 - 1.5.10) Orientação sobre problemas associados à diminuição da função salivar.
 - 1.5.11) **Crianças:** Extração de dentes decíduos com mobilidade e com esfoliação prevista durante o período da quimioterapia.

Autora:



- **Silvia Paula de Oliveira (CRO-RJ 29.191)**
- Especialista em Estomatologia e Periodontia (OCEX)
- Mestre e Doutora em Patologia Bucodental (UFF)
- **E-mail:** silviaoliv@hotmail.com

Continua na próxima edição